






Milieu	Espèce	Dérangement			Changement d'occupation du sol					Maintien d'un habitat favorable				Présence d'infrastructures humaines					Pratiques agricoles et industrielles								
		Activités de pleine nature	Travaux forestiers	Travaux agricoles	Construction	Plantations forestières	Fermeture du milieu naturelle	Mise en culture céréalière	Maintien de pâturage	Préservation du milieu forestier	Maintien d'espaces ouverts	Maintien des milieux humides	Eoliennes	Lignes électriques	Poteaux creux	Ouvrages d'art	Routes	Utilisation d'insecticides et pesticides	Utilisation d'anticoagulants	Irrigation	Rejets d'effluents						
Forêt	Aigle botté																										
	Circéaie Jean-le-Blanc																										
	Bondrée apivore																										
	Milan noir																										
	Milan royal																										
	Nyctale de l'engmalm																										
Pics																											
Milieux semi-ouverts	Pie-grièche écorcheur																										
	Busard Saint-Martin																										
	Chevéche d'Athens																										
	Petit-duc scops																										
Milieux ouverts	Oedienème criard																										
	Hibou des marais																										
	Engoulevent d'Europe																										
	Busard Saint-Martin																										
	Busards																										
	Alouette lulu																										
Fauvette orphée																											
Milieu aquatique	Martin-pêcheur d'Europe																										
	Cincle plongeur																										
Milieu rupestre	Faucon pèlerin																										
	Grand-duc d'Europe																										
	Martinet à ventre blanc																										

-  Impact positif (en tout temps)
-  Impact positif (avec restrictions : respect des périodes critiques, ...)
-  Impact négatif (en tout temps)
-  Impact négatif en période critique
-  Espèce ou milieu non concerné par la mesure