

# LE BAGUAGE DES OISEAUX EN CÔTE-D'OR EN 2007

En France, l'activité de baguage des oiseaux est coordonnée par le Centre de Recherche par le Bagueage sur les Populations d'Oiseaux (CRBPO), laboratoire du Museum National d'Histoire Naturelle. Elle a pour but d'améliorer les connaissances sur l'écologie et la démographie des différentes espèces.

En Côte-d'Or, plusieurs programmes sont en cours, mis en œuvre par des bagueurs du CEOB - l'Aile Brisée et de la Choue. La présente note a pour but de présenter brièvement l'activité en 2007.

## Les hirondelles

Les opérations de baguage en période de nidification se sont poursuivies durant le printemps et l'été. En 2007, seul le secteur d'Eringes a été suivi (Cf. note du Tiercelet n°16 de 2007). Pour avoir des informations sur les échanges entre les villages, quelques granges ont également été sondées sur le village de Fresne et de Jours-Les-Baigneux.

Au total, 170 Hirondelles rustiques ont été capturées, correspondant à 157 individus différents (23 adultes et 134 jeunes). Pour les adultes, le taux de contrôle inter-annuel est de 39 %.

93 Hirondelles de fenêtres ont été capturées, correspondant à 87 individus différents (78 adultes et 9 jeunes). Pour les adultes, le taux de contrôle inter-annuel est de 37 %.

Pour les deux espèces, des adultes capturés lors de la première année ont été recapturés. Ils étaient donc âgés d'au moins 5 ans.

Deux séances de captures sur des dortoirs se formant lors des migrations postnuptiales ont été réalisées dans la roselière d'un étang en périphérie du Morvan, les 14 et 30 août.

294 Hirondelles rustiques ont été capturées (48 adultes et 246 jeunes de l'année). Ces résultats sont encourageants et le baguage mériterait d'être poursuivi en 2008 en complétant le réseau qui se développe à l'intérieur des terres (Champagne-Ardenne et Rhône-Alpes).

A noter, deux individus bagués à l'étranger, un en Belgique et un en Espagne, ont été contrôlés. Pour le moment, aucune information relative à ces individus n'a été fournie par les centres de baguage.

## Le STOC capture (Suivi Temporel des Oiseaux Communs)

Afin de suivre l'évolution démographique des populations d'oiseaux communs, le CRBPO développe plusieurs protocoles, basés sur des recensements auditifs (STOC EPS) ou par baguage (STOC capture).

En Côte d'Or, 2 stations de STOC capture ont été suivies en 2007, une à Sussey-le-Maupas (suivie depuis 7 ans par Hervé JACOB) et une nouvelle à Eringes.

Sur la station d'Eringes, implantées dans un ensemble de vieux vergers, 135 individus de 21 espèces ont été capturés. Les deux espèces les plus capturées sont la Mésange charbonnière et la Fauvette à tête noire.

## Suivi de la migration en Val de Saône

Durant la fin d'été, 11 sessions de baguage ont été réalisées, entre le 02 août et le 15 septembre, dans un ancien bras mort de la Saône, propriété de la commune d'Esbarres. Le milieu dans lequel les filets ont été tendus est un mélange de phragmitaie et de saulaie.

Le baguage sur les sites de migration a pour but de mieux connaître les voies migratoires des espèces et, par quelques suivis biométriques, de définir la qualité des milieux pour les haltes migratoires.

Sur l'ensemble des sessions, 528 oiseaux de 32 espèces ont été capturés. Sur la période, les deux espèces très largement majoritaires sont la Rousserole effarvate, en première moitié de période et la Fauvette à tête noire ensuite.

Le 18 août, une Rousserole effarvate baguée en Belgique a été contrôlée. Cet oiseau avait été bagué comme jeune de l'année exactement deux ans plus tôt (le 18/08/2005) à Anvers.

## **SPOL Mangeoire : suivi de l'hivernage à la mangeoire**

Durant l'hiver 2007-2008, un suivi par baguage à la mangeoire a été mené à proximité de la station STOC d'Eringes dans le but de suivre la sédentarité des espèces durant l'hiver. Il est actuellement trop tôt pour tirer des conclusions. Cependant, on peut noter qu'au moins 7 Mésanges charbonnières baguées (sur 34 baguées) durant le printemps ont été contrôlées durant l'hiver, sur le même site. Les deux espèces les plus capturées sont les Mésanges charbonnières et bleues. Les premiers résultats permettent déjà d'observer une fréquentation des postes de nourrissage bien plus importante que ne pouvait le laisser penser les simples observations. En effet, la fréquentation journalière doit approcher les 100 individus différents de mésanges alors que l'observation ne permet que rarement d'en voir plus de 10 en même temps.

Une autre station de SPOL mangeoire a également été lancée à Agey durant l'hiver.

Enfin, plusieurs programmes d'études spécifiques sont menés en Côte-d'Or, pouvant éventuellement déborder sur quelques départements limitrophes.

Plusieurs programmes de baguage, associé à des marquages alaires colorés sont menés sur des rapaces diurnes : Busard cendré, Faucon crécerelle et Milan royal.

Deux importants programmes sont menés par la Choue sur la Chouette hulotte et l'Effraie des clochers.

A vous de jouer : récolter et envoyer des informations sur les oiseaux bagués.

Un oiseau mort ou écrasé est peut-être bagué. Quand vous le pouvez, pensez à vérifier leurs pattes. Si l'oiseau porte une bague :

1. essayez de la récupérer ou notez l'ensemble des informations qu'elle contient (un nom de museum indiquant dans quel pays l'oiseau a été bagué et un code alphanumérique identifiant l'oiseau)
2. envoyez la bague ou ses informations au CEOB - l'Aile Brisée accompagnées de la date et du lieu de découverte et, aussi précisément que possible, les conditions dans lesquelles l'oiseau est mort.

Certaines marques colorées avec un code alphanumérique peuvent être lisibles à la longue-vue : bagues pour les oiseaux de grande taille (cigognes, cormorans, Grande aigrette...), plaques sur le bec pour des canards et marques sur les ailes pour des rapaces. N'hésitez pas à informer l'association de vos observations d'oiseaux bagués pour qu'elle transfère ces informations au centre de baguage concerné et connaître le « pedigree » de l'oiseau observé.

**Pierre DURLET**