



OBSERVATION D'UN ELANION BLANC *ELANUS CAERULEUS* DANS LE VAL DE SAONE

Antoine ROUGERON

Découverte

En déplacement pour la basse vallée du Doubs ce 30 mai 2009, je réussis à me motiver à faire sonner le réveil 1 heure plus tôt, pour pouvoir aller fouiller un peu le Val de Saône. Je décide d'aller faire un tour au sud de Seurre, afin de confirmer (ou d'infirmer) la présence d'une Pie-grièche à tête rousse, observée là un peu plus tôt dans le mois.

A peine descendu de la voiture, je me mets à parcourir aux jumelles les haies et arbres, encore nombreux, délimitant les prairies de fauche de ce joli secteur. Quelques champs de maïs et deux gravières encore en exploitation viennent compléter ce paysage assez diversifié.

Une haie interrompue me fait parcourir un coin de ciel des jumelles durant quelques secondes. Là, dans le bleu, très loin (environ 500 mètres), un oiseau blanc traverse mon champ de vision furtivement. Durant cette fraction de seconde, j'envisage un quelconque laridé... Je reviens en arrière rapidement, retrouve l'oiseau instantanément, et dans la foulée, je comprends... Ce petit rapace blanc, argent et noir, au vol si particulier, me rappelle une observation faite dans les Landes quelques années auparavant : un Elanion blanc !

L'oiseau vole loin et haut dans le ciel. Je crains que ce ne soit qu'un individu de passage et qu'il ne puisse être revu. Mais heureusement, il finit par descendre et chasser au-dessus des prairies de fauche, qui attirent à cette époque de nombreux Milans noirs, notamment. L'oiseau sera ainsi revu le soir même, puis le lendemain, par différents observateurs, dans un secteur d'environ 2km².

Taxonomie et répartition

Espèce polytypique, cinq sous-espèces décrites (GENSBØL, 2004). L'aire de reproduction de l'Elanion blanc s'étend largement sur l'Afrique et l'Eurasie. Cependant, la sous-espèce nominale nichant en Europe se limite au Nord de l'Afrique, à la Péninsule ibérique, et au sud-ouest de la France. Ses biotopes de prédilection sont vastes, et se composent de milieux ouverts ou semi-ouverts (paysages cultivés, prairies de fauche, savanes, steppes... avec arbres ou boqueteaux).

Les populations espagnole et portugaise sont en expansion, à l'image de la situation constatée en France (GRANGE, 2003).

Statut en France et en Côte-d'Or

L'installation de ce rapace dans notre pays est encore récente, avec les premiers couples cantonnés dans les Pyrénées Atlantiques dans les années 80. La première reproduction est prouvée en 1990, puis les effectifs passent à 4 couples, en 1998, 6 en 2001, 13 en 2003, 14-15 en 2006, 22 en 2007 et 28 en 2008 ! A cette progression de la population aquitaine, il faut ajouter des reproductions ponctuelles dans des régions proches (Gironde, Hautes-Pyrénées), mais aussi dans les Grands Causses en 1998 et dans le Rhône en 2005 (DUBOIS *et al.*, 2008).

Parallèlement à cela, l'espèce est chaque année de plus en plus fréquemment contactée en France, un peu partout, et à tous les mois l'année (avec un pic en avril-mai). En 2006, en dehors de son aire de reproduction habituelle, 4 observations d'Elanion blanc ont été homologuées par le CHN en 2006, puis 6 en 2007 (REEBER, FREMONT, FLITTI et le CHN, 2008). Cette progression se poursuit en 2008 avec 8 mentions (REEBER et le CHN, 2009). A ce titre, l'espèce ne sera plus soumise à homologation nationale à compter du 1^{er} janvier 2010, mais sera reversée aux compétences des CHR (Comités d'Homologation Régional).

MARCHANT (1869), MAYAUD (1936, *in* DUBOIS, *et al.*, 2008) et DE VOGUE (1948) citent plusieurs observations pour la Côte-d'Or, qui laisseraient à penser que l'élanion fut peut-être régulier dans la région. Mais l'imprécision de ces mentions doit inciter à la prudence. Une seule donnée récente, certaine et documentée apparaît pour le département : celle d'un ind. observé du 21 au 23 (29 en réalité) novembre 2003 à Samerey / Laperrière-sur-Saône (FREMONT et le CHN, 2005).

Description de l'oiseau et comportements observés

L'identification de l'Elanion blanc ne pose aucune difficulté. L'oiseau observé était un adulte :

- parties supérieures gris argenté et épaules (couvertures sus-alaires) noires,

- parties inférieures blanches, pointes des ailes (rémiges primaires) noires,
- petite queue blanche. Celle-ci apparaît faiblement échancrée quand l'oiseau est perché. Une fois en vol, sa coupe devient droite.
- grosse tête blanche immaculée, yeux rouges, petit bec crochu à la cire jaune et au bout noir. La calotte est lavée de gris.
- ailes larges et pointues, de forme bien différente de celle d'un faucon ou d'un épervier,
- le vol de l'élanion est très particulier, et peut rappeler plusieurs autres oiseaux selon ses attitudes. Tout d'abord, il pratique souvent le vol surplace, à l'instar du Faucon crécerelle. En vol plané, il tient ses ailes nettement relevées, à la manière du Busard cendré. Lorsque l'oiseau est en chasse et prospecte à faible hauteur une prairie, son vol très souple rappelle également un busard, voire un Hibou des marais. Enfin, en vol battu, ses battements d'ailes légers et aisés évoquent une guifette.

Durant ces deux jours d'observation, l'oiseau fut observé souvent en chasse au-dessus des prairies de

fauche, mais également au-dessus des terrains à nu des gravières en exploitation. Un vieil et grand arbre mort semblait avoir les faveurs du visiteur comme reposoir, bien que régulièrement harcelé par le Faucon crécerelle du coin. Enfin, lors du second jour de présence, très venteux, le petit rapace blanc fut une dernière fois localisé, perché à l'abri d'Éole dans une peupleraie jouxtant une des gravières.



Elanion blanc, Labergement-les-Seurre, mai 2009 (A.Rougeron)

BIBLIOGRAPHIE

- DE VOGUE G. (1948) – Inventaire des Oiseaux du département de la Côte-d'Or. 36-37.
- DUBOIS P.-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P. (2008) – Nouvel inventaire des Oiseaux de France. Avifaune de la France métropolitaine. Nathan. Paris. 134-135.
- GENSBØL B. (2004) – Guide des rapaces diurnes ; Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Delachaux et Niestlé. 50-52.
- GRANGE J.-L. (2003) – L'erratisme de l'Elanion blanc *Elanus caeruleus* en France au cours du XX^e siècle. *Ornithos*, 10-3 : 110-115.
- FREMONT & le CHN (2005) – Les oiseaux rares en France en 2003. *Ornithos*, 12-1 : 2-45.
- MARCHANT L. (1869) – Catalogue des oiseaux observés dans le département de la Côte-d'Or. 44-45.
- REEBER S., FREMONT J.-Y., FLITTI A. & le CHN (2008) – Les oiseaux rares en France en 2006-2007. *Ornithos*, 15-5 : 313-355.
- REEBER & le CHN (2009) – Les oiseaux rares en France en 2008. *Ornithos*, 16-5 : 273-315.
- ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D. (1999) – Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes rouges et recherche de priorités. Populations Tendances Menaces. Conservation. SEOF/LPO. Paris. 136-137.